

## **Din hund behandlas med cytostatika enligt bifogat protokoll.**

Cytostatika hämmar tumörcellers delning men påverkar också andra, friska celler i kroppen. Framför allt påverkas tarmceller, kroppens immunförsvar och ibland slemhinnan i urinblåsan. Denna påverkan kan ge upphov till biverkningar som du som djurägare bör vara uppmärksam på.

\* Kräkning och diarré. Vid lindriga symtom räcker det att tillfälligt ge djuret skonkost, om symtomen är kraftigare bör medicinsk behandling sättas in.

\* Feber och annat tecken på infektion. Om kroppstemperaturen ligger över 39,5 grader, kontakta veterinär omgående liksom om hundens allmäntillstånd blir allmänt påverkat.

\* Tecken på urinvägsinfektion. Om hunden kissar oftare än normalt, har blod i urinen eller ont då den kissar kontakta veterinär omgående.

Cytostatika utsöndras via urin och avföring, framför allt dagarna efter behandling. Vid kontakt med avföring, urin eller kräkningar från hunden, använd handskar.

Hunden kan uträtta sina behov utomhus som vanligt men du bör plocka upp efter den.

Den cytostatika som ges hemma skall ges med handskar på.

Vi avråder från att behandla hundar som bor i familj med gravida kvinnor eller små barn.

Om det är något ni undrar över tveka inte att kontakta oss.