

Eftervårdsråd Klokapselbrott

Din hund/katt har behandlats för ett klokapselbrott. Den brutna klokapseln har tagits bort under narkos och den blottlagda pulpan är nu öm för beröring de första 4-7 dagarna.

Er/ Din hund/katt har varit sövd och kan fortfarande vara trött och lite vinglig. Vänta med att erbjuda mat och vatten tills Öjebyn verkar normal och börja med att ge lite vatten och sedan en mindre portion mat. Det är inte ovanligt att inte vill äta samma dag som operationen, men den bör äta dagen efter.

Bandaget som Öjebyn har på tassen kan sitta i 2d. Efter det så bör tassen hållas skyddad så länge pulpan är fuktig eller öm. Använd tex en strumpa som skydd.

Titta till pulpan och kringliggande vävnad noga varje dag och se så det inte svullnar upp eller ser kladdigt ut. Vid behov rengör med koksaltlösning eller mild tvål & vatten. Ser det onormalt ut, luktar illa eller svullnar upp, kontakta kliniken.

En ny klo kommer att växa ut på 3-6 månader.

Tänk på att lägga över en plastpåse eller skyddssko vid promenad utomhus så bandaget inte blir blött eller smutsigt.

Hunden/katten får absolut inte slicka på klon eller bandaget, använd krage eller skyddssko.

Att regelbundet klippa klorna på din hund/katt kan förebygga framtida klokapselbrott.

Detta gäller ej katter som vistas ute.